

CUIDADOS COM A OVELHA PRENHE E SEU CORDEIRO

Flavio Echevarria
Luiz Alberto Ribeiro



*Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Centro de Pesquisa de Pecuária dos Campos Sulbrasilieiros
Ministério da Agricultura e do Abastecimento*

Exemplares desta publicação devem ser solicitados à:

Embrapa Pecuária Sul

Área de Comunicação Empresarial e Negócios Tecnológicos

BR 153 - km 595 - Vila Industrial

Caixa Postal 242

CEP 96400-970 - Bagé, RS

Fone/Fax: (0XX53) 242-8499

Tiragem: 300 exemplares

Comitê de Publicações

Coordenador: Roberto Silveira Collares

Membros: Carlos Otávio Costa Moraes

Francisco de Paula Jardim Alves-Branco

Joal José Brazzale Leal

João Carlos Pinto Oliveira

José Otávio Neto Gonçalves

Odoni Loris Pereira de Oliveira

Vicente Celestino Pires Silveira

Produção gráfica:

Diagramação e capa (arte/criação/execução): Roberto Cimirro Alves

Echevarria, F.A.M.

Cuidados com a ovelha prenhe e seu cordeiro. / - F.A.M. Echevarria,

L.A. Ribeiro. - Bagé: Embrapa CPPSul, 2000.

14p. (Embrapa CPPSul, Circular Técnica, 16)

1. Ovinos. I. Título. II. Série

CDD 636.3

© Embrapa Pecuária Sul

SUMÁRIO

ALIMENTAÇÃO	05
DIAGNÓSTICO DE GESTAÇÃO - ULTRA-SOM	06
LIMPEZA PRÉ-PARTO	07
VACINAÇÕES	07
DOSIFICAÇÕES	08
POTREIROS ABRIGADOS	08
REVISANDO O REBANHO	09
OVELHA CAÍDA	09
HIPOTERMIA	10
VIGILÂNCIA CONTRA PREDADORES	12

CUIDADOS COM A OVELHA PRENHE E SEU CORDEIRO

Flavio Echevarria¹
Luiz Alberto Ribeiro²

Chegando a época de parição dos rebanhos ovinos no Rio Grande do Sul, é muito importante que o ovinocultor tome algumas providências antes que as ovelhas iniciem a parir.

A seguir passamos a apresentar alguns cuidados que precisam ser planejados com antecedência e atenção. Estes cuidados dizem respeito à ovelha e aos cordeiros logo após o nascimento.

ALIMENTAÇÃO

A ovelha deve receber uma boa alimentação durante toda sua vida, mas isto é ainda mais importante nas últimas 6 a 8 semanas antes do parto. É neste período que o cordeiro mais cresce e é nesta fase que a ovelha irá acumular condições para um bom desenvolvimento da placenta, do cordeiro e do úbere, e assim desenvolver condições para que o parto ocorra sem

¹ Méd. Vet., M.V.Sc., PhD, Pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, Caixa Postal 242, CEP 96400-970 - Bagé, RS. echevarr@cppsul.embrapa.br

² Méd. Vet., M.V.Sc., Departamento de Medicina Animal, Faculdade de Veterinária - UFRGS, Av. Bento Gonçalves, 9090; CEP 90540-000 - Porto Alegre; RS. berto@orion.ufrgs.br

problemas. É fundamental que as ovelhas estejam em muito bom estado corporal. Se houver pouca disponibilidade de pasto, suplemente com ração ou feno. Lembre-se que a má alimentação da ovelha durante a prenhez é responsável pelas maiores perdas de cordeiros ao parto ou logo após.